

Tabela 2. Terminy i dawki stosowania preparatu WAPNOVIT® w uprawie warzyw

Termin stosowania	Dawka [l/ha]
PAPRYKA	
I-II - rozwój liści i pędów bocznych (BBCH 13-29);	4-6
III - 1.-3. owoc osiągnął typową wielkość i kształt (BBCH 71-73);	
IV-V - rozwój owoców (BBCH 74-76), zabiegi co 5-10 dni	
POMIDOR	
I-II - rozwój liści (BBCH 13-19);	4-6
III - początek kwitnienia: otwarte pierwsze kwiaty w 1.-3. kwiatostanie (BBCH 61-63);	
IV-VI - rozwój owoców (BBCH 71-76)	
OGÓREK	
I - rozwój liści i pędów bocznych (BBCH 13-29);	4-6
II - na pędzie głównym widoczny zawiązek 6.-7. pąka kwiatowego na wydłużonej szypułce (BBCH 56-57);	
III-IV - rozwój owoców (BBCH 71-75)	
WARZYWA KAPUSTOWATE	
I - rozwój liści (BBCH 15-19);	4-6
II - początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41);	
III-IV - rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 42-45* lub do 48**) *kalafior, broku ** kapusta: biała, czerwona, włoska i pekińska	4-6
WARZYWA KORZENIOWE	
I - rozwój liści (BBCH 13-19)	4-6
II - początek rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 41);	
III-IV - rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 42-48)	
WARZYWA STRĄCZKOWE	
I - rozwój strąków (BBCH 71-73)	4-6