



XLIII edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Eliminacje szkolne 2018
Blok Produkcja zwierzęca - Test

1. Największym producentem mięsa drobiowego w Europie jest:

- a/ Francja
c/ Polska
- b/ Niemcy
d/ Włochy

2. Największa produkcja mleka krowiego w Polsce jest w województwie:

- a/ Mazowieckim
c/ Podlaskim
- b/ Dolnośląskim
d/ Wielkopolskim

3. Ile wynosi średnie spożycie mięsa wołowego w Polsce (kg/osobę):

- a/ 1,8
c/ 5,0
- b/ 30,0
d/ 15,0

4. Narząd produkujący żółć to:

- a/ żołądek
c/ śledziona
- b/ trzustka
d/ wątroba

5. Największe spożycie mięsa w Polsce dotyczy:

- a/ wołowiny
c/ jagnięciny
- b/ drobiu
d/ wieprzowiny

6. Mieszanka kału, moczu i wody to:

- a/ gnojowica
c/ obornik
- b/ gnojówka
d/ kompost

7. Anemia u prosiąt występuje przez niedobór:

- a/ Zn
c/ Se
- b/ Fe
d/ Cu

8. Leghorn to rasa:

- a/ bydła mięsnego
c/ kur nieśnych
- b/ świń
d/ ślimaków hodowlanych

9. Najkrótsza ciąża jest u:

- a/ krowy
c/ owcy
- b/ klaczy
d/ lochy

10. Przodkiem konia jest:

- a/ osioł
c/ muł
- b/ tarpan
d/ mustang

11. Występowanie u krów mlecznych tężyczki pastwiskowej jest skutkiem:

- a/ nadmiaru magnezu we krwi
c/ brak witaminy B
- b/ niedoboru magnezu we krwi
d/ zatrucie azotanami

12. Solanina to substancja toksyczna występująca w:

- a/ burakach pastewnych
c/ zzieleniałych ziemniakach
- b/ ziarnie żyta
d/ nasionach łubinu

13. Która z wymienionych pasz dla drobiu zawiera najwięcej białka ogólnego:

- a/ śruta poekstrakcyjna rzepakowa
c/ olej sojowy
- b/ ziarno pszenżyta
d/ nasiona grochu

14. Do badania mięsności tusz tuczników służy:

- a/ pehametr
c/ higrometr
- b/ spektrometr
d/ choirometr

15. Która z pasz nie może być surowcem mieszanek paszowych dla drobiu rzeźnego:

- a/ mączka mięsna
c/ olej sojowy
- b/ śruta z nasion grochu
d/ otręby pszenne

16. Płynnych nawozów organicznych nie należy stosować w okresie:

- a/ wiosennym
c/ jesiennym
- b/ letnim
d/ zimowym

17. Do makroelementów nie zalicza się:

- a/ S
c/ P
- b/ K
d/ Zn

18. Miano coli to wskaźnik:

- a/ twardości wody
c/ czystości mikrobiologicznej wody
- b/ trwałości mleka
d/ barwy mięsa

19. Witamina, której niedobór powoduje chorobę beri-beri to:

- a/ D₃
c/ B₆
- b/ B₁
d/ C

20. Mastitis to choroba występująca u:

- a/ prosiąt
c/ krów mlecznych
- b/ jagniąt
d/ cieląt

21. Jajo od kur z chowu klatkowego oznaczone jest cyfrą:

- a/ 0
c/ 1
- b/ 2
d/ 3

22. Brojlery kurze w gospodarstwach ekologicznych powinny być odchowywane przez co najmniej (dni):

- a/ 49
c/ 42
- b/ 81
d/ 35

23. Inbred to kojarzenie ze sobą osobników:

- a/ spokrewnionych ze sobą
c/ różnych gatunków
- b/ nie spokrewnionych ze sobą
d/ różnych ras

24. Surowca do produkcji kawioru dostarcza:

- a/ jesiotr
c/ karp
- b/ okoń
d/ węgorz

25. Mocznik paszowy w żywieniu bydła opasowgo jest źródłem:

- a/ azotu
c/ wapnia
- b/ aminokwasów
d/ fosforu

26. Ocenę wartości użytkowej łącznie z oceną wartości hodowlanej prowadzi się dla:

- a/ drobiu
c/ pszczoł
- b/ trzody chlewnej
d/ krów mlecznych

27. Rasa bydła Jersey reprezentuje typ:

- a/ kombinowany
c/ mleczny
- b/ mięsny
d/ wszechstronnie użytkowy

28. Homogenizacja to proces:

- a/ rozbijania tłuszczu w mleku
c/ odtuszczania mleka
- b/ wytrącania kazeiny
d/ oczyszczania mleka

29. Kiszonkę z odkoszulkowanych kolb kukurydzy określa się skrótem:

- a/ PMR
c/ TMR
- b/ CCM
d/ JPM

30. Deratyzacja to:

- a/ usuwanie rogów b/ wypalanie znaków na skórze
c/ usuwanie ogonów d/ niszczenie gryzoni

31. Ochwat to choroba dotycząca:

- a/ rogów u bydła b/ mięśni u świń
c/ kopyt u koni d/ pazurów u drobiu

32. Liczba niosek w jednym kurniku w gospodarstwie ekologicznym nie może przekroczyć (szt.):

- a/ 3000 b/ 1500
c/ 500 d/ 250

33. Wady zwrotne przy zakupie konia to:

- a/ dychawica świszcząca b/ ślepotą miesięczną
c/ łykawość d/ wszystkie wymienione w pkt. a,b,c

34. Lanolina to składnik występujący w:

- a/ mięsie łososia b/ mleku kozim
c/ wełnie owczej d/ mleczku pszczelim

35. Inkubacja jaj kury trwa (dni):

- a/ 12 b/ 16
c/ 21 d/ 26

36. Nowa rodzina pszczoła to:

- a/ rój b/ gniazdo
c/ kłęb d/ rójka

37. Nauka o psach to:

- a/ hipologia b/ kynologia
c/ andrologia d/ ichtiologia

38. Który organ nie występuje u świni:

- a/ trzustka b/ żwacz
c/ jelito cienkie d/ wątroba

39. Źródłem aminokwasów w paszach są:

- a/ białka b/ węglowodany
c/ tłuszcze d/ witaminy

40. W jakiej temperaturze nie należy przechowywać jaj wylęgowych:

- a/ 18 – 21 °C b/ 5 – 10 °C
c/ 10 – 14 °C d/ 0 °C i poniżej

41. Jajo kurze o masie 65 g zalicza się do klasy:

- a/ L b/ M
c/ XL d/ S

42. Podstawowa jednostka dziedziczności to:

- a/ gameta b/ gen
c/ genotyp d/ genom

43. Kręgi piersiowe z żebrami łączy:

- a/ mostek b/ miednica
c/ rzepka d/ obojczyk

44. Dopuszczalny limit komórek somatycznych w mleku (tys./ml) to:

- a/ 100 b/ 400
c/ 200 d/ 80

